

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### **CORUNO 16 mg comprimés à libération prolongée**

#### Molsidomine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Coruno et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coruno ?
3. Comment prendre Coruno ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Coruno ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Coruno et dans quels cas est-il utilisé ?**

Coruno est un médicament qui dilate les artères et les veines.

Coruno est utilisé dans le traitement de longue durée de l'angine de poitrine pour éviter les crises angineuses. Coruno ne convient pas pour stopper une crise angineuse qui débute ou qui est déjà commencée.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coruno ?**

##### **Ne prenez jamais Coruno**

- si vous êtes allergique à la molsidomine ou à l'un des autres composants de Coruno mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si votre tension artérielle est anormalement et gravement basse ;
- dans certains cas particuliers de crise cardiaque, d'insuffisance grave de la circulation ou d'insuffisance de fonctionnement du cœur : votre médecin décidera si vous pouvez ou non prendre Coruno ;
- si vous êtes enceinte ;
- si vous allaitez ;
- si votre organisme ne supporte pas certains sucres (voir "Coruno contient du lactose").

**Ne prenez jamais** de médicaments qui augmentent l'érection (tels que le sildénafile, vardénafile, tadalafil) pendant votre traitement par Coruno car vous risqueriez une chute importante et grave de la tension artérielle.

De même, vous ne pouvez pas prendre Coruno en même temps que certains médicaments utilisés en cas d'excès de tension dans les poumons (tels que le riociguat) car cela augmenterait le risque de chute de la tension artérielle.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Coruno.

Faites attention avec Coruno :

- si vous avez tendance à avoir des chutes de tension car Coruno peut aggraver la diminution de la tension artérielle;
- si vous souffrez d'une diminution du fonctionnement du foie : votre médecin vous prescrira probablement une quantité de molsidomine plus faible (voir "Comment prendre Coruno").

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous ou si elle l'a été dans le passé.

### **Autres médicaments et Coruno**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez jamais de médicaments qui augmentent l'érection (tels que le sildénafile, vardénafile, tadalafil) pendant votre traitement par Coruno car vous risqueriez une chute importante et grave de la tension artérielle.

De même, vous ne pouvez pas prendre Coruno en même temps que certains médicaments utilisés en cas d'excès de tension dans les poumons (tels que le riociguat) car cela augmenterait le risque de chute de la tension artérielle.

Ne prenez pas de dérivés nitrés (médicaments contre l'angine de poitrine) en traitement de longue durée pendant que vous êtes traité par Coruno car les effets de ces médicaments s'additionnent.

Toutefois, en cas de crise aiguë d'angine de poitrine, vous pouvez prendre des dérivés nitrés par voie sublinguale, c'est-à-dire sous forme de comprimés à laisser fondre sous la langue ou de spray à appliquer sous la langue, sans interrompre votre traitement par Coruno.

Vous pouvez utiliser Coruno avec la plupart des médicaments pour le cœur et les vaisseaux. Cependant, si vous prenez d'autres médicaments qui diminuent la tension artérielle en même temps que Coruno, vous pourriez avoir une chute plus importante de votre tension artérielle. Parlez-en à votre médecin.

Pendant votre traitement par Coruno, vous devez éviter de prendre certains médicaments utilisés dans la migraine (tels que l'ergotamine) car ces médicaments pourraient diminuer l'effet de Coruno et inversement.

### **Coruno avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Vous pouvez prendre Coruno en même temps que des aliments ou des boissons.

Toutefois, si vous buvez de l'alcool pendant votre traitement par Coruno, vous pourriez avoir une diminution plus importante de la tension artérielle.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Vous ne pouvez pas prendre Coruno si vous êtes enceinte car on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes concernant l'utilisation de la molsidomine pendant la grossesse. De même, vous ne pouvez pas allaiter pendant votre traitement par Coruno car on ne sait pas si la molsidomine passe dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Si vous êtes gêné par une baisse de tension, des vertiges, des nausées ou des maux de tête, ne conduisez pas de véhicule et n'utilisez pas de machines.

### **Coruno contient du lactose**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## **3. Comment prendre Coruno ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Adultes :

Vous devez prendre 1 comprimé de Coruno le matin, au petit déjeuner.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser Coruno. Coruno étant un traitement chronique, il doit généralement être pris pendant de très longues périodes.

### Diminution du fonctionnement des reins et patients âgés :

Si vous souffrez d'une diminution du fonctionnement des reins ou si vous êtes une personne âgée, vous pouvez généralement prendre la quantité normale de Coruno (1 comprimé par jour).

### Diminution du fonctionnement du foie :

Si vous souffrez d'une diminution du fonctionnement du foie, votre médecin vous prescrira probablement une quantité de molsidomine plus faible.

### Mode d'emploi :

Avalez les comprimés avec un peu d'eau sans les croquer ni les sucer, le matin au petit déjeuner.

Les comprimés ne peuvent pas être coupés.

### **Si vous avez pris plus de Coruno que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris trop de Coruno, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

En cas d'utilisation de trop fortes doses, vous pouvez souffrir d'une diminution de la tension avec sensation de malaise, vertiges, perte de connaissance. Si ces phénomènes apparaissent, vous devez vous allonger et surélever les jambes, en attendant l'arrivée du médecin.

### Informations pour le médecin traitant :

S'il y a des signes d'une diminution très importante de la tension, le malade devra être hospitalisé. Un lavage d'estomac sera réalisé si la prise du médicament est récente.

Il n'y a pas d'antidote spécifique ; le traitement sera basé sur les symptômes observés.

### **Si vous oubliez de prendre Coruno**

Reprenez le traitement dès que possible, sans pour autant modifier les quantités à prendre ni le nombre de prises. Ne prenez jamais une double dose de Coruno pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre Coruno**

Si vous arrêtez votre traitement par Coruno, vous risquez de souffrir de crises d'angine de poitrine plus fréquentes. Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d'arrêter votre traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, Coruno peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus fréquents sont des maux de tête, qui surviennent au début du traitement. Ils diminuent ou disparaissent le plus souvent au cours du traitement.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir pendant votre traitement par Coruno :

Au niveau du système nerveux : maux de tête, vertiges.

Au niveau du cœur et des vaisseaux : chute de la tension artérielle, surtout en position debout (hypotension orthostatique) ; chute grave de la tension artérielle (p.ex. avec choc).

Au niveau digestif : nausées, troubles de la digestion.

Au niveau allergique : allergie sur la peau, spasme des bronches, réaction allergique grave de tout le corps (choc anaphylactique).

Au niveau du système sanguin et lymphatique : faible nombre de plaquettes sanguines (thrombocytopenie).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou. Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be), e-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be). Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, e-mail: [pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu) ; Link : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Coruno ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

A conserver dans l'emballage d'origine.

N'utilisez pas Coruno après la date de péremption indiquée sur l'emballage après la mention "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Coruno**

- La substance active est la molsidomine. Chaque comprimé contient 16 mg de molsidomine.
- Les autres composants sont : hypromellose, lactose monohydraté, bédénate de glycéryl, mannitol, polyvinylpyrrolidone, stéarate de magnésium, dioxyde de silice colloïdale, oxyde de fer jaune (E172).

### **Aspect de Coruno et contenu de l'emballage extérieur**

Coruno 16 mg comprimés à libération prolongée se présente sous forme de comprimés ronds, biconvexes, constitués de 3 couches.

Il est disponible en boîtes de 28 et de 42 comprimés sous plaquettes alu/PVC-PVDC orange et en boîtes de 28 et 42 comprimés sous plaquettes alu/PVC-PVDC orange à usage hospitalier.

La molsidomine est également disponible sous forme de comprimés contenant 2 mg et 4 mg de molsidomine (Corvaton) et sous forme d'une solution injectable à usage strictement hospitalier.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : THERABEL PHARMA S.A.  
Boulevard de l'Humanité 292  
B-1190 Forest

Fabricant : THERABEL PHARMACEUTICALS Ltd,  
55 Percy Place  
Dublin 4, D04 CX38  
Ireland

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché : BE239224.

Mode de délivrance : médicament soumis à prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2022.**