

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

CORUNO 16 mg tabletten met verlengde afgifte

Molsidomine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Coruno en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Coruno niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Coruno?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Coruno?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Coruno en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Coruno is een geneesmiddel dat de slagaders en aders openzet.

Coruno wordt gebruikt als langetermijnbehandeling van angor pectoris om angoraanvallen te voorkomen. Coruno is niet geschikt om een beginnende of begonnen angoraanval te stoppen.

2. Wanneer mag u Coruno niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Coruno niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor molsidomine of voor één van de andere bestanddelen van Coruno. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter ;
- als uw bloeddruk abnormaal en zeer laag is;
- in welbepaalde gevallen van hartaanval, ernstig falen van de bloedsomloop of hartfalen: uw arts zal bepalen of u al dan niet Coruno mag innemen;
- als u zwanger bent;
- als u borstvoeding geeft;
- als u bepaalde suikers niet verdraagt (zie "Coruno bevat lactose").

Neem nooit geneesmiddelen in die de erectie versterken (zoals sildenafil, vardenafil, tadalafil) tijdens uw behandeling met Coruno omdat u het gevaar loopt van een aanzienlijke en ernstige bloeddrukval.

Evenzo, kunt u Coruno niet tegelijkertijd innemen met bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor overmatige bloeddruk in de longen (zoals riociguat), omdat dit het risico van een bloeddrukval zou verhogen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Coruno?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Coruno inneemt.

- Als u gemakkelijk last hebt van bloeddrukval omdat Coruno de bloeddrukdaling kan verergeren;
- Als uw lever minder goed werkt: uw arts zal u dan waarschijnlijk een kleinere hoeveelheid molsidomine voorschrijven (zie "Hoe gebruikt u Coruno?").

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Coruno nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem nooit geneesmiddelen in die de erectie versterken (zoals sildenafil, vardenafil, tadalafil) tijdens uw behandeling met Coruno omdat u het gevaar loopt van een aanzienlijke en ernstige bloeddrukval. Neem eveneens nooit Coruno in tegelijkertijd met bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor overmatige bloeddruk in de longen (zoals riociguat), omdat dit het risico van een bloeddrukval zou verhogen.

Neem geen nitraten (geneesmiddelen tegen angor pectoris) als langetermijnbehandeling tijdens uw behandeling met Coruno omdat deze geneesmiddelen mekaars effect versterken. In geval van acute angoraanval mag u alleszins wel nitraten onder de tong gebruiken, zoals smelttabletjes voor onder de tong of een spray voor onder de tong, zonder dat u daarvoor uw behandeling met Coruno moet onderbreken.

U mag Coruno gebruiken samen met de meeste geneesmiddelen voor hart en bloedvaten. Indien u samen met Coruno echter andere geneesmiddelen inneemt die de bloeddruk verlagen, kunt u een sterkere bloeddrukval hebben. Bespreek dit met uw arts.

Tijdens uw behandeling met Coruno moet u bepaalde geneesmiddelen die bij migraine worden gebruikt (zoals ergotamine) vermijden, omdat deze geneesmiddelen het effect van Coruno kunnen verminderen en vice versa.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U mag Coruno innemen samen met voedsel en drank.

Indien u alcohol drinkt tijdens uw behandeling met Coruno, kunt u een sterkere bloeddrukdaling hebben.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

U mag geen Coruno innemen als u zwanger bent omdat er heden onvoldoende gegevens zijn over het gebruik van molsidomine tijdens de zwangerschap.

Zo ook mag u geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met Coruno omdat niet bekend is of molsidomine in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als u last hebt van een lage bloeddruk, draaierigheid, misselijkheid of hoofdpijn.

Coruno bevat lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u Coruno?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen:

U moet 1 tablet Coruno innemen 's morgens, bij het ontbijt.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Coruno moet gebruiken. Omdat Coruno een chronische behandeling is, moet het doorgaans gedurende lange tijd ingenomen worden.

Verminderde nierfunctie en bejaarde patiënten:

Als uw nierfunctie verminderd is of als u bejaard bent, mag u meestal de normale hoeveelheid Coruno innemen (1 tablet per dag).

Verminderde leverfunctie:

Als uw leverfunctie verminderd is, zal uw arts u waarschijnlijk een kleinere hoeveelheid molsidomine voorschrijven.

Gebruikswijze:

Slik de tabletten in met wat water, 's morgens bij het ontbijt. Niet op kauwen en niet op zuigen. De tabletten mogen niet gesplitst worden.

Heeft u te veel van Coruno gebruikt?

Wanneer u te veel van Coruno heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

In geval van gebruik van te grote hoeveelheden, kunt u last krijgen van een bloeddrukdaling met algemeen onwel voelen, draaierigheid, bewustzijnsverlies. Als dit bij u het geval is, moet u gaan liggen, met de benen omhoog, terwijl u op de arts wacht.

Informatie voor de behandelende arts:

Als er tekenen zijn van een zeer belangrijke bloeddrukdaling, moet de patiënt gehospitaliseerd worden. In geval van recente inname, moet een maagspoeling uitgevoerd worden.

Er bestaat geen specifiek antidotum; de behandeling moet zich richten op de waargenomen symptomen.

Bent u vergeten Coruno te gebruiken?

Hervat de behandeling van zodra mogelijk zonder evenwel de in te nemen hoeveelheid of het aantal innamen te veranderen. Neem geen dubbele dosis Coruno om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Coruno

Als u uw behandeling met Coruno stopzet, loopt u risico om vaker angoraanvallen te krijgen. Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Coruno bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, die optreedt bij het begin van de behandeling. Deze vermindert of verdwijnt doorgaans gedurende de behandeling.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen tijdens uw behandeling met Coruno:

Ter hoogte van het zenuwstelsel: hoofdpijn, draaierigheid.

Ter hoogte van hart en bloedvaten: bloeddrukval, vooral in staande houding (orthostatische hypotensie); ernstige bloeddrukval (bv. met shock).

Ter hoogte van het spijsverteringsstelsel: misselijkheid, spijsverteringsmoeilijkheden.

Allergieën: allergie van de huid, piepende ademhaling, ernstige allergische reactie van het hele lichaam (anafylactische shock).

Ter hoogte van het bloed- en lymfevatensysteem: laag aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, www.fagg.be.

Afdeling Vigilantie: Website: www.eenbijwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé. Site internet: www.guichet.lu/pharmacovigilance.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Coruno?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke buitenverpakking.

Gebruik Coruno niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Coruno?

- De werkzame stof in dit middel is molsidomine. Elke tablet bevat 16 mg molsidomine.
- De andere stoffen in dit middel zijn: hypromellose, lactose monohydraat, glycerylbehenaat, mannitol, polyvinylpyrrolidon, magnesiumstearaat, colloïdale siliciumdioxide, geel ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Coruno eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Coruno 16 mg tabletten met verlengde afgifte zijn ronde, dubbelbolle tabletten, opgebouwd uit 3 lagen. Het is beschikbaar in dozen met 28 en met 42 tabletten in oranje alu/PVC-PVDC blisterverpakking en in dozen met 28 en 42 tabletten in oranje alu/PVC-PVDC blisterverpakking voor ziekenhuisgebruik.

Molsidomine is ook beschikbaar als tabletten met 2 mg en 4 mg molsidomine (Corvaton) en als oplossing voor injectie, uitsluitend voor ziekenhuisgebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: THERABEL PHARMA N.V.
Humaniteitslaan 292
B-1190 Vorst

Fabrikant: THERABEL PHARMACEUTICALS Ltd,
55 Percy Place
Dublin 4, D04 CX38
Ireland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE 239224 ; LU 2008069803.

Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2024.